




Echelle de Triage Conjointe Inter Organisation : Âge ≥ 12 ans



NON



NON



Echelle de Triage Conjointe Inter Organisation : Âge < 12



1

RECHERCHE DE CRITÈRES ROUGES

• Ne réagit pas

A&B: VOIES AÉRIENNES ET RESPIRATION

• Stridor

• Détresse respiratoire* ou cyanose centrale

C: CIRCULATION

• Temps de recoloration capillaire > 3 s

• Pouls faible et rapide

• Saignements abondants

• Extrémités froides

• 2 des signes suivants :

-Léthargie

-Yeux creusés

-Pli cutané qui s'efface très lentement

-Boît peu

D: ETAT NEUROLOGIQUE

• Convulsions

• État de conscience altéré (confusion, agitation, irritabilité permanente ou léthargie) avec raideur de la nuque, hypothermie ou fièvre

• Hypoglycémie (si connue)

AUTRE

• nourrisson < 8 jours

• Âge < 2 mois et temp. < 36 °C ou > 39 °C

• Traumatisme à haut risque*

• Risque d'amputation*

• Douleur testiculaire/scrotale aiguë ou priapisme

• Morsure de serpent

• Empoisonnement/ingestion ou exposition à des substances chimiques dangereuses*

• Grossesse + critères rouges chez l'adulte

OUI

TRANSFERT IMMÉDIAT EN ZONE DE DÉCHOCAGE

NON

2

RECHERCHE DE CRITÈRES JAUNES

A&B: VOIES AÉRIENNES ET RESPIRATION

• Tout gonflement/masse de la bouche, la gorge ou du cou

• Sifflement (sans critères rouges)

C: CIRCULATION

• Incapacité à boire ou se nourrir

• Vomit tout

• Diarrhée continue

• Déshydratation

• Pâleur sévère (sans critères rouges)

D: ETAT NEUROLOGIQUE

• Agitation, irritabilité permanente ou léthargie

• Douleur sévère

AUTRE

• Tout nourrisson âgé de 8 jours à 6 mois

• Malnutrition avec fonte musculaire sévère visible OU œdème aux deux pieds

• Traumatisme/brûlures (sans critères rouges)

• Agression sexuelle

• Diagnostic connu nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence

• Nouvelle éruption cutanée qui s'aggrave au fil des heures ou desquamation (sans critères rouges)

• Exposition nécessitant une prophylaxie d'urgence (ex. morsure d'animal)

• Grossesse (sans critères rouges)

• Céphalée (sans critères rouges)

OUI

TRANSFERT EN ZONE DE TRAITEMENT

Les patients présentant un trouble clinique ou des signes vitaux à haut risque nécessitent un examen immédiat par le médecin superviseur ou d'être sur-triés en jaune ou en rouge

OUI

3

CHERCHER DES SIGNES VITAUX À HAUT RISQUE

Temp <36° ou >39°

SpO2 < 92%

AVPU autre que A

FR	<1 an	1- 4 ans	5 -12 ans
Élevée	50	40	30
Faible	25	20	10
FC	<1 an	1-4 ans	5-12 ans
Élevée	180	160	140
Faible	<90	<80	<70

NON

TRANSFERT EN ZONE DE SOINS AMBULATORIES, OU EN ZONE D'ATTENTE

*Cf. carte de référence

Echelle Triage Conjointe Inter Organisation: **RISQUE ÉLEVÉ** *Carte de Référence

Risque de Traumatismes Sévères

 Traumatisme Général	 Accident de la Voie Publique
Chute de deux fois sa hauteur	Accident de la voie publique à haute cinétique
Tout traumatisme pénétrant (en excluant ceux des parties distales au coude/genou si saignement contrôlé)	Piéton ou cycliste percuté par un véhicule
Trauma par écrasement	Autre passager du même véhicule décédé sur place
Polytraumatisme (blessures sur plusieurs zones du corps)	Accident de la route sans ceinture
Patient présentant un trouble de la coagulation ou sous anticoagulants	Coincé dans ou éjecté du véhicule (y compris les motos)
Grossesse	



Grands Brûlés

Les critères ci-dessous concernent les brûlures partielles ou du troisième degré Plus de 15% de la surface corporelle	Brûlures par inhalation
Brûlure circonférentielles ou du visage ou du cou	Âge du brûlé < 2 ans ou > 70 ans



Risque d'Amputation

- Patient avec membre:
- Sans pouls OU
 - Douloureux + au moins un des signes suivants: pâleur, faiblesse, engourdissement ou œdème massif après un traumatisme

Autres Critères de Risque Élevé



Signes de Détresse Respiratoire

Adulte	Enfant
Respiration très rapide ou très lente	Respiration très rapide
Incapacité à parler ou marcher sans aide	Incapacité à parler, manger ou téter
Confusion, somnolence ou agitation	Battement des ailes du nez, geignement
Utilisation de muscles accessoires (ex. scalènes, intercostaux, abdominaux)	Utilisation des muscles accessoires (ex. hochement de tête, tirage sous-costal)



Ingestion / Exposition

Les signes cliniques ne permettent pas toujours à eux seuls d'identifier les patients nécessitant une intervention d'urgence. Les patients présentant un risque élevé d'ingestion ou d'exposition doivent initialement être catégorisés **rouges** pour subir une évaluation médicale rapide

