




SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE pour les NOUVEAU-NÉS à risque*



Contrôler la glycémie avant l'allaitement



GLYCÉMIE CIBLE



NOTER

toutes les glycémies & les changements de perfusion
DANS LE DOSSIER DU PATIENT

Dans les 48 premières heures de vie



≥45mg/dL

Contrôler jusqu'à l'obtention d'une glycémie **NORMALE 3 FOIS DE SUITE** ✓✓✓

Après 48 heures de vie



≥60mg/dL

Contrôler jusqu'à l'obtention d'une glycémie **NORMALE 3 FOIS DE SUITE** ✓✓✓

*À RISQUE À LA NAISSANCE

- Poids de naissance <2500 g
- Nouveau-né macrosome (PN> 4000 g)
- Prématuré (surtout si < 35 semaines AG)
- Nouveau-né de mère diabétique
- Nouveau-né de mère sous traitement de labétalol ou propranolol
- Asphyxie périnatale

*À RISQUE EN GÉNÉRAL

- Nouveau-né malade (ECUN, sepsis, paludisme, etc.)
- **Hypothermie**
- Antécédent d'une ou plusieurs épisodes d'hypoglycémie
- Changement d'alimentation ou mise à jeun

SI

GLYCÉMIE :

<45mg/dL
<2,5mmol/L

TRAITER
pour

HYPOGLYCÉMIE

