

Type de Document	Protocole Ebola/Marburg	Statut	Finale
Section	OCA, OCB, OCBA, OCG, OCP, WaCA, Ubuntu	Langue	Français
Auteurs	Groupe de biosécurité des maladies du filovirus	Dernière révision	05/2026
Approbation DirMed	Daniela Garone, Matthew Coldiron (Dirmed adjoint délégué)	Approuvé	25/05/2026

SOP Buanderie - Procédures gestion, nettoyage et désinfection du linge

Portée

Cette procédure standard s'applique à tout le personnel impliqué dans la gestion du linge et les activités de la buanderie dans les installations FHV lorsque les matériels à usage unique ne sont pas disponibles (en raison de l'approvisionnement des fournitures), et que le linge réutilisable est la seule alternative. Elle s'applique UNIQUEMENT lorsque brûler ou détruire n'est pas envisageable, et que les linges ne sont pas visiblement contaminés.

Avertissement

Idéalement, les unités FHV ne devraient pas avoir des linges réutilisables pour les patients, car cela représente un risque que cela implique pour le personnel de blanchisserie lors du retraitement.

La **meilleure solution** sera de détruire le linge ou de disposer de matériel à usage unique jetable

Dans les cas où cela n'est pas possible, il existe une seconde alternative (UNIQUEMENT si le linge n'est pas visiblement souillé)

Gestion du linge au niveau des installations (CTF)

Exigences de sécurité

- L'hygiène des mains doit toujours être réalisée avant de mettre et après avoir retiré les gants.
- Évitez de secouer, de casser ou de manipuler excessivement le linge afin de minimiser l'aérosolisation et la contamination environnementale.
- Le nettoyage doit toujours précéder la désinfection.
- Le linge doit être pré-désinfecté avant d'être transporté vers la zone de lavage.
- Il doit être collecté et transporté vers la zone de lavage désignée dans des contenants fermés et étanches.
- Les circuits de travail 'propres' et 'sales' doivent rester physiquement séparés tout au long du processus de retraitement.
- Les précautions standards PCI pour la gestion de la buanderie dans les soins de santé doivent être respectées en permanence.
- Le personnel de blanchisserie doit recevoir une formation sur :
 - Précautions PCI,
 - Manipulation sûre du linge,
 - Utilisation des EPI,
 - Préparation et manipulation du chlore,
 - Procédures de gestion des déversements.

Principes clés

Idéalement, les unités FHV devraient éviter la réutilisation de linge pour les patients en raison des risques liés à la manipulation des tissus contaminés lors du retraitement.

L'approche privilégiée est la suivante :

- Utilisation de linge jetable/à usage unique ; ou
- Destruction/incinération sécurisée du linge usagé.

Le linge réutilisable ne doit être envisagé que seulement lorsque la destruction ou les alternatives à usage unique ne sont pas opérationnellement réalisables.

Cette procédure s'applique UNIQUEMENT lorsque :

- Le linge n'est pas visiblement souillé de sang, de selles, de vomi, d'urine ou d'autres fluides corporels ; et
- La destruction/l'incinération n'est pas envisageable.

Le linge visiblement contaminé doit être jeté comme déchets infectieux et envoyé à la destruction.

B. Équipe responsable :

Personnel des zones à haut risque : Responsable de :

- Gestion initiale du linge,
- Pré-désinfection
- Transport sûr respectant le sens de sortie prévu pour l'infrastructure

Personnel de blanchisserie / Agent de blanchisserie : Responsable de :


- Procédures de nettoyage et de désinfection,
- Séchage et stockage sécurisés,
- Entretien de la séparation entre les circuits de travail propre/sale.

C. Matériels nécessaires :

Dans la zone à haut risque

- EPI complet selon le protocole FHV
- Solution chlorée 0,5 %
- Conteneur de transport étanche avec couvercle

Dans la zone buanderie



- Lunettes ou visière
- Respirateur N95/FFP2
- Tablier étanche
- Gants de ménage réutilisables
- Savon/détergent
- Produits de nettoyage dédiés
- Solution chlorée 0,1 %
- Solution chlorée 0,5 % (en cas de déversement de fluides corporels)
- Machine à laver (si disponible)
- Ligne de séchage ou sèche-linge
- Fer-à-repasser

D. Procédure

1. Pré-désinfection dans la zone à haut risque

Important : Cette procédure s'applique **UNIQUEMENT** au linge qui n'est **pas visiblement sale**.

Si le linge est visiblement contaminé :

- NE l'envoyez PAS à la buanderie.
- Éliminez en tant que déchet infectieux selon les procédures de gestion des déchets.

Procédure

1. Gérez le linge avec précaution et évitez de secouer.
2. Placez les linges en dehors de la zone de soins aux patients mais toujours dans le circuit à haut risque.
3. Appliquez ou immergez le linge avec solution chlorée 0,5 %.
4. Maintenez un temps de contact de 5 minutes.
5. Placez les linges dans un contenant de transport fermé et étanche.
6. Transférez en toute sécurité vers la zone de transfert de blanchisserie désignée.

NB : Une exposition répétée à 0,5 % de chlore peut endommager certains tissus selon la qualité du textile.

2. Nettoyage et désinfection dans la zone de lavage

Récupérez le conteneur de transport fermé dans la zone de transfert et amenez-le à la zone de décontamination de la buanderie.

Retraitement du linge patient (pas visiblement souillé)

Lavage en machine (préférentiel)

1. Lavez avec du savon/détergent à la machine à laver.

Lavage des mains (si aucune machine à laver n'est disponible)

1. Lavez manuellement avec du savon et de l'eau.
2. Rincez soigneusement.

Désinfection chimique

1. Immergez le linge dans une solution chlorée à 0,1 % pendant 5 minutes.
2. Rincez avec de l'eau propre trois (3) fois en suivant les protocoles de buanderie.
3. Essorez soigneusement l'excès d'eau.
4. Sécher en plein soleil dès que possible.
5. Effectuez une inspection visuelle.
6. Repasser et plier les linges.
7. Rangez dans la zone propre désignée à cet effet.

Si disponibles, des machines à laver et des sèche-linges peuvent être utilisées. Si aucun cycle de désinfection thermique n'est inclus dans le programme de lavage de la machine, assurez-vous de désinfecter chimiquement à la main après le lavage dans la machine.

SOP VHF LAUNDRY PROCEDURES

LINEN MANAGEMENT, CLEANING AND DISINFECTION

1. PRE-DISINFECTION IN HIGH-RISK ZONE (ONLY IF LINEN IS NOT VISIBLY SOILED)

1 Handle linen carefully and avoid shaking. 	2 Place linen outside the patient care area but still within the high-risk circuit. 	3 Immerse linen in 0.5% chlorine solution. 	4 Maintain a contact time of 5 minutes. 	5 Place linen into a closed, leak-proof transport container. 	6 Pick up the container from the transfer zone and bring it to the laundry decontamination area. 
--	--	---	---	---	---




IMPORTANT: If linen is visibly soiled (blood, stool, vomit, urine, or other body fluids), **DO NOT** send to laundry. Dispose of as infectious waste for destruction.



Hand hygiene before putting on and after removing (rubber) gloves.

2. CLEANING AND DISINFECTION IN LAUNDRY ZONE

A. PATIENT LINEN REPROCESSING

1 Wash linen thoroughly with soap/detergent and water. 	2 Rinse with clean water. 	3 Immerse linen in 0.1% chlorine solution for 5 minutes. 	4 Rinse with clean water 3 times following laundry protocols. 	5 Wring out excess water carefully. 	6 Hang linen to dry under direct sunlight. 	7 Once completely dry: inspect, iron, fold and store in the designated clean storage area. 
---	--	---	---	--	---	---

B. BEDSHEETS AND BLANKETS (NOT VISIBLY SOILED)

1 Machine wash with soap/detergent. If no machine: hand wash with soap and water. 	2 Soak in 0.1% chlorine solution for 5 minutes. 	3 Rinse with clean water 3 times following laundry protocols. 	4 Wring out excess water carefully. 	5 Dry in direct sunlight. 	6 Visual check. Iron and fold the items. 	7 Bring blankets and bedsheets to the designated clean area. 
---	--	--	---	--	---	---

MATERIALS NEEDED

IN HIGH-RISK ZONE

- Full PPE
- Chlorine solution 0.5%
- Leak-proof transport container



IN LAUNDRY ZONE

- Scrubs, boots
- Goggles, N95/FFP2, apron
- Reusable protective gloves
- Soap/detergent
- Chlorine solution 0.1%
- Cleaning supplies
- Washing machine (if available)
- Drying line or dryer, Iron

KEY PRINCIPLES



Cleaning before disinfection.



Avoid shaking linen.



Use closed, leak-proof containers.



Keep dirty and clean areas separate.



Follow standard IPC and laundry protocols.

USE OF MACHINES

If washing machines and dryers are available, they may be used.

If no thermal disinfection cycle is included in the machine's program, ensure chemical disinfection by hand after the machine wash (0.1% chlorine for 5 minutes).



REUSABLE LINEN MANAGEMENT IN FVD SETTINGS CARRIES OCCUPATIONAL RISK.

MINIMIZE REUSE, STRENGTHEN INFRASTRUCTURE AND TRAINING, AND TRANSITION TO SAFER ALTERNATIVES WHENEVER POSSIBLE.