

Type de document	Protocole Ebola/Marburg	Statut	Final
Section	OCA, OCB, OCBA, OCG, OCP, WaCA, Ubuntu	Langue	Français
Auteurs	Groupe de biosécurité sur les maladies à filovirus	Dernière révision	05/2026
Approbation DirMed	Daniela Garone, Matthew Coldiron (Dirmed adjoint délégué)	Approuvé	25/05/2026

SOP - Désinfection des gants dans les centres de traitement des filovirus (CTF)

Avertissement – Utilisation des gants d'examen

Les gants d'examen sont conçus pour **un usage unique** et ne doivent pas être systématiquement désinfectés ou réutilisés. La norme de soins reste **le retrait des gants suivi d'une hygiène des mains** entre chaque contact avec un patient ou chaque tâche.

Les pratiques décrites dans cette SOP concernant la désinfection des mains gantées constituent **des mesures exceptionnelles spécifiques aux centres de traitement des filovirus (CTF)**, où les soins continus, les contraintes liées aux EPI et les considérations de sécurité peuvent temporairement nécessiter que l'hygiène des mains soit effectuée sur des mains gantées.

Ces pratiques **ne doivent pas être interprétées comme un remplacement des pratiques standard d'hygiène des mains**, et l'utilisation des gants doit revenir aux protocoles à usage unique dès que cela est opérationnellement possible.

Objectif

Définir le protocole standardisé de désinfection des gants pendant la prestation de soins au sein des CTF, afin de garantir la sécurité des professionnels de santé tout en optimisant l'utilisation des gants dans des limites sûres.

Champ d'application

Cette procédure s'applique à tout le personnel clinique entrant et travaillant dans la zone à haut risque (ZHR) du CTF qui porte deux paires de gants d'examen et qui dispense des soins aux patients et/ou est en contact avec l'environnement ou des objets contaminés.

Responsabilités

- **Tout le personnel** doit respecter cette procédure opérationnelle standard (SOP) lorsqu'il se trouve dans la « HRZ ».
- **Les responsables de la prévention et du contrôle des infections (PCI)** veilleront au respect de cette procédure et garantiront la disponibilité des fournitures.
- **Une formation** permettra de familiariser les nouveaux membres du personnel avec les techniques appropriées et leur justification.

Définitions

- **SHA** : désinfectant pour les mains à base d'alcool (au moins 70 % d'alcool)
- **Cycle de désinfection des gants** : un cycle de désinfection à l'aide d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool ou d'eau et de savon.
- **Salissures visibles** : présence de sang, de vomissures, de matières fécales ou de toute matière organique visible sur les gants.
- **Gants fortement contaminés** : gants recouverts de matières biologiques épaisses ou étendues.

Matériel nécessaire

- Distributeur de désinfectant pour les mains à base d'alcool (fixe ou portable)
- Approvisionnement en eau propre
- Savon liquide
- Serviettes en papier jetables (à usage unique)
- Poubelle à couvercle à pédale

Procédure

Désinfection de routine avec de la SHA

1. Indications :

- Entre les interventions sur les patients dans la zone à haut risque
- Après un contact avec des patients ou l'environnement n'entraînant pas de salissures visibles
- Avant de toucher des zones propres ou du matériel

2. Étapes :

- Appliquez une noisette de SHA sur vos mains gantées.
- Frottez soigneusement pendant 60 secondes : paumes, dos des mains, entre les doigts, autour des pouces, bouts des doigts.
- Laisser les gants sécher complètement à l'air libre (ne pas les essuyer).

*Remarque : si **des gants en nitrile sont utilisés comme gants extérieurs**, leur nombre de cycles de désinfection est limité en cas d'utilisation de SHA. Les gants en nitrile ne doivent pas subir plus de 5 cycles de désinfection avec SHA. Après 5 utilisations, les gants extérieurs en nitrile doivent être changés dans un espace dédié (voir la procédure opérationnelle standard - Changement des gants extérieurs à la station).*

Évaluation après désinfection :

- Inspectez visuellement les gants pour détecter d'éventuelles déchirures, perforations ou traces de colle.
- Si un dommage est constaté, remplacez immédiatement le gant extérieur.
- Si les deux gants sont endommagés, lavez-vous immédiatement les mains et rendez-vous dans la zone de retrait pour sortir de la zone à haut risque (HRZ).

Salissures visibles – Nettoyer à l'eau et au savon

1. Indications :

- Gants visiblement souillés par du sang, des matières fécales, du vomi, etc.
- Gants exposés à des contaminants épais ou collants

2. Étapes :

- Lavez-vous les mains gantées à l'eau claire avec **du savon liquide**.
- Frottez toutes les surfaces des gants **pendant 40 secondes**, en veillant à éliminer mécaniquement les salissures.
- Rincez abondamment à l'eau.
- Séchez avec une serviette en papier jetable.

- Après le séchage, effectuez un cycle SHA (conformément à la section 6.1) si vous poursuivez les soins au patient, afin de garantir que la surface des gants est désinfectée après l'élimination des matières organiques.
- 3. **Si les gants ne peuvent pas être nettoyés en 40 secondes :**
 - Retirez et remplacez les gants extérieurs dans la sous-station désignée.
- 4. **Évaluation après le nettoyage :**
 - Inspectez visuellement les gants pour détecter tout dommage, dégradation ou contamination persistante.
 - Si le gant extérieur est endommagé ou collant, retirez-le et remplacez-le.
 - Si le gant intérieur est contaminé ou endommagé, la personne doit quitter immédiatement la zone, se laver les mains et se rendre à la station de retrait.

Désinfection de routine avec une solution chlorée à 0,5 %

1. **Indications :**
 - Entre les interventions auprès des patients dans la zone à haut risque (HRZ)
 - Après un contact avec des patients ou l'environnement n'entraînant pas de salissures visibles
 - Avant de toucher des zones propres ou du matériel
2. **Étapes :**
 - Se laver les mains avec une solution chlorée en veillant à un contact complet
 - Respecter le temps de contact approprié (au moins 2 minutes pour les mains gantées).

Résumé des critères de changement de gants

Condition	Action
Plus de 5 cycles de SHA (seulement pour les gants nitriles)	Changer les gants extérieurs
Salissures visibles impossibles à éliminer en moins de 40 secondes	Changer les gants extérieurs
Intégrité des gants compromise (déchirures, adhérence, dégradation)	Changer les gants extérieurs. Si les deux gants sont endommagés, passer à la procédure de retrait et de sortie
Les gants restent collants ou opaques après le lavage	Changer les gants extérieurs

7. Consignes de sécurité

- Ne changez les gants extérieurs que dans les zones désignées à l'intérieur de la zone à haut risque (HRZ).
- Ne changez jamais les gants intérieurs dans la zone à haut risque ; utilisez toujours la zone de retrait.

- N'utilisez jamais de SHA ou de chlore seuls sur des gants visiblement souillés, car ces produits n'éliminent pas les matières organiques et peuvent ne pas permettre une désinfection efficace en présence de celles-ci.
- Faites preuve de prudence pour éviter toute contamination lors du retrait des gants. Assurez-vous d'être accompagné d'un collègue qui supervisera l'opération. À tout moment pendant le lavage, veillez tout particulièrement à empêcher l'eau ou les contaminants de s'infiltrer au niveau du poignet et d'atteindre le gant intérieur. Ceci est essentiel pour préserver l'intégrité de la barrière formée par les deux gants et garantir la protection du personnel. Dans la mesure du possible, privilégiez le port de gants à manchette allongée comme gants extérieurs.

8. Documentation et amélioration de la qualité :

- Toute rupture, tout dommage ou tout changement prématuré de gants doit être signalé et consigné.
- Les niveaux de stock de gants et les taux d'utilisation doivent être examinés chaque semaine.