








FRÉQUENCE RESPIRATOIRE & FRÉQUENCE CARDIAQUE			
Fréquence respiratoire et fréquence cardiaque normales chez les enfants selon l'âge			
 AGE	 FRÉQUENCE RESPIRATOIRE Valeurs normales (respirations/min)	 FRÉQUENCE CARDIAQUE Valeurs normales (battements/min)	
 < 2 mois	30-60	100-160	
 2 à 11 mois	30-50	90-160	
 1 à 5 ans	25-40	80-140	
 6 à 12 ans	20-30	70-120	
 > 12 ans	14-20	60-100	

TENSION ARTERIELLE (mmHg)			
Tension artérielle normale chez les enfants en fonction de l'âge			
 AGE	 SYSTOLIQUE Valeurs normales**	 DIASTOLIQUE Valeurs normales**	 HYPOTENSION SYSTOLIQUE
 1 à 11 mois	72-104	37-56	< 70
 1 à 2 ans	86-104	40-61	< 70 + (âge en années x 2)
 3 à 5 ans	89-108	46-68	
 6 à 8 ans	93-111	55-72	
 9 ans	97-112	59-74	
 10 à 11 ans	98-116	59-75	< 90
 12 à 15 ans	103-129	61-80	

**Du 50e au 90e percentile pour l'âge

AVPU				
AVPU évalue le niveau de conscience des enfants				
				
A lerte (Éveillé)	V oix (Répond à un stimulus verbal)	P* ain (Répond à un stimulus douloureux)	U nresponsive (Aucune réponse)	
↓	↓	↓	↓	
ÉTAT SATISFAISANT	ÉTAT DE CONSCIENCE ALTÉRÉ	ÉTAT DE CONSCIENCE ALTÉRÉ ou COMA	ÉTAT DE CONSCIENCE ALTÉRÉ ou COMA	
Tout score inférieur à « A » est anormal et doit mener immédiatement vers une évaluation neurologique plus détaillée ainsi que du niveau de conscience au moyen par exemple de l'échelle de coma de Glasgow * Un stimulus douloureux = pression supra-orbitaire au niveau de l'incisure supra-orbitaire, pression sur le lit de l'ongle ou pression sternale/frottement sternal				

TEMPÉRATURE ET SATURATION EN OXYGÈNE			
Seuils de température et de saturation en oxygène pour les enfants			
TEMPÉRATURE(°C)		SATURATION EN OXYGÈNE Valeurs normales %	
			
EMPLACEMENT	FIÈVRE	HYPOTHERMIE	
Axillaire	> 37.5	< 35	
Central	> 38	< 35.5	
SpO2 ≥ 92%***			

*** Un seuil plus élevé de > 94 % est utilisé dans la prise en charge des urgences des enfants gravement malades (voir le guide pédiatrique 2024)